

Surveillance für akute respiratorische Erkrankungen in Niedersachsen

Wochenbericht 8/2026 24.02.2026


Das Ziel der **ARE-Surveillance (ARE für Akute Respiratorische Erkrankungen)** besteht darin, zeitnah und flächendeckend sowohl den aktuellen Anteil erkrankter Personen mit ARE-Symptomatik festzustellen als auch die aktuell vorherrschenden viralen Erreger zu identifizieren.

Die Surveillance besteht aus zwei Bausteinen: Einem durch die Gesundheitsämter der Landkreise und kreisfreien Städte (LK/SK) in Niedersachsen vermittelten freiwilligen Meldesystem über den ARE-Krankenstand in vorschulischen Kindertageseinrichtungen (Kitas) sowie der virologischen Untersuchung von Rachenabstrichen von ARE-Patienten aus mehr als 40 ausgewählten Arztpraxen und Krankenhäusern (Sentinel-Praxen).

Die Karte gibt ausschließlich einen Überblick über den Krankenstand in den Kindertageseinrichtungen, nicht aber über die Ergebnisse der Rachenabstrichuntersuchungen. Die Praxen und Krankenhäuser, die Proben zur Virusdiagnostik einsenden, sind über ganz Niedersachsen verteilt, auch wenn nicht in jedem Landkreis ein entsprechender Einsender lokalisiert ist.

ARE-Situation nach Angaben aus Kindertageseinrichtungen

KW 8/2026



Teilnahmen in der 8. Kalenderwoche (KW):

- LK/SK 36 von 44
- Kitas 296

Anzahl ARE-erkrankter Kinder:

- 4.626 von 22.391 betreuten Kindern
- ARE-Krankenstand: 20,7 %
(Vorwoche: 19,4 %)

ARE-Aktivität in den LK/SK:

- Keine 1 (Vorwoche: 1)
- Gering 4 (Vorwoche: 7)
- Mittel 11 (Vorwoche: 11)
- Hoch 8 (Vorwoche: 5)
- Sehr hoch 12 (Vorwoche: 10)

ARE-Aktivität in Niedersachsen insgesamt:

Hohe Aktivität
(Vorwoche: hohe Aktivität)

Der ARE-Krankenstand in den niedersächsischen Kitas ist in der 8. KW im Vergleich zur Vorwoche leicht angestiegen, blieb aber auf einem ähnlichen Niveau wie seit der 5. KW. In Niedersachsen lag insgesamt weiterhin eine hohe ARE-Aktivität vor.

Ansprechpartner am Niedersächsischen Landesgesundheitsamt, Roesebeckstr. 4 – 6, 30449 Hannover

Arbeitsbereich Virologie

Tel.: 0511 / 4505 -201

Dr. A. Baillot, Dr. M. Monazahian

Internet

www.are-surveillance.nlga.niedersachsen.de

Infektionsepidemiologie

Tel.: 0511 / 4505 -

K. Graue (-245), Dr. J. Dreesman (-200)

Ergebnisse der virologischen Untersuchungen am NLGA


KW 8/2026

	Anz. pos.	%
Adenoviren	5	5
Bocaviren	2	2
Influenzaviren	18	16
Metapneumoviren	4	4
Parainfluenzaviren	3	3
Rhino-/Enteroviren	11	10
RSV	19	17
Saisonale Coronaviren	14	13
SARS-CoV-2	0	0


Proben mit Virusnachweis* 66 60

Proben gesamt 110

* mehrere Nachweise in einer Probe möglich



Die Positivitäten können sich rückwirkend noch ändern, da einige der untersuchten Proben aufgrund ihres Entnahmedatums der Vorwoche zugeordnet werden.




Anm. zu den Abbildungen:

Die hellgrau eingefärbten Säulen signalisieren, dass in der entsprechenden Kalenderwoche die Aussagekraft der Positivrate aufgrund geringer Probenzahl (≤ 30) eingeschränkt ist. Die rosa eingefärbten Säulen repräsentieren die aktuelle Woche.

In der 8. KW ist die Positivrate der Influenzaviren deutlich zurückgegangen und lag auf demselben Niveau wie die der RS-Viren. Dabei entfielen 68 % der Nachweise auf den Subtyp Influenza A/H3N2 und 32 % auf Influenza A/H1N1pdm09.


Saisonvergleich



Die Darstellung zeigt den Verlauf des ARE-Krankenstandes in den teilnehmenden Kitas und der Positivraten (Anteil der jeweiligen Nachweise in allen eingesandten Sentinel-Proben) für Influenza und SARS-CoV2 in den Saisons 2024/2025 und 2025/2026.

Krankmeldungen in Niedersachsen

Einen weiteren Beitrag zur ARE-Surveillance leistet die Auswertung von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (AU). Unabhängig von Test- und Meldevorgaben wird hiermit ein Frühwarnsystem bereitgestellt, das auf den aktuell eingehenden AU aller krankengeldberechtigten Mitglieder (KGbM) der AOK Niedersachsen beruht. Wöchentlich wird die Anzahl aller eingegangenen AU erfasst, auf denen eine akute respiratorische Erkrankung angegeben wurde. Hierbei werden nur die Erstbescheinigungen berücksichtigt. Diese Daten werden im Rahmen von PanCHECK-iN, einem gemeinsamen Projekt der AOK Niedersachsen und des NLGA, erhoben.



In der 8. KW haben 36.564 krankengeldberechtigte AOK-Mitglieder (KGbM) eine AU-Erstbescheinigung aufgrund einer akuten respiratorischen Erkrankung erhalten. Das entspricht für diese Woche einer Inzidenz von 2.870 je 100.000 KGbM. Von den genannten AU-Bescheinigungen erfolgten 0,4 % aufgrund einer Covid-19-Diagnose (Vorwoche: 0,4 %).

Melddaten gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Covid-19:

In der 8. KW wurden 97 laborbestätigte Covid-19-Fälle in Niedersachsen gemäß IfSG übermittelt. Seit Beginn der Saison in der 27. KW 2025 sind insgesamt 8.847 laborbestätigte Covid-19-Fälle übermittelt worden. Seit der 27. KW 2025 wurden 73 durch Laboruntersuchungen bestätigte Covid-19-Todesfälle übermittelt (Stand 23.02.2026).

RSV:

In der 8. KW wurden 363 laborbestätigte RSV-Fälle in Niedersachsen gemäß IfSG übermittelt. Seit Beginn der Saison in der 27. KW 2025 sind insgesamt 1.991 laborbestätigte RSV-Fälle übermittelt worden (Stand 23.02.2026).

Influenza:

In der 8. KW wurden 1.451 laborbestätigte Influenzafälle in Niedersachsen gemäß IfSG übermittelt. Es handelt sich in 1.391 Fällen um Influenza A-Virus (davon 22-mal A(H3N2) und 17-mal A(H1N1)pdm09) und fünfmal um Influenza B-Virus. Seit Beginn der Saison in der 27. KW 2025 sind insgesamt 13.509 laborbestätigte Influenzafälle übermittelt worden. Seit der 27. KW 2025 wurden 61 durch Laboruntersuchungen bestätigte Influenza-Todesfälle übermittelt (Stand 23.02.2026).

Influenzaerkrankungen führen häufig nicht unmittelbar, sondern in Verbindung mit vorbestehenden Grunderkrankungen zum Tode. Die tatsächliche Anzahl direkt oder indirekt durch Influenza bedingter Todesfälle lässt sich erst nach Ende der Saison anhand der Todesfallstatistik feststellen. Abhängig von der Schwere der jeweiligen Influenzasaison kann die Übersterblichkeit in Deutschland mehr als 20.000 Fälle betragen.

Übermittelte Influenza-Erreger seit 27. KW 2025

	Anteil
Influenza A/B Virus nicht differenziert nach A oder B	3 %
Influenza B Virus	1 %
Influenza A Virus, nicht differenziert	92 %
Influenza A (H3N2)	3 %
Influenza A (H1N1)pdm09	1 %

■ ARE-Situation in anderen Bundesländern

Auch andere deutsche Bundesländer führen eine ARE-Surveillance durch. Diese Systeme sind mehr oder weniger gut vergleichbar. Durch einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch der Bundesländer werden die Surveillance-Systeme fortlaufend optimiert. Ein aufeinander abgestimmtes Vorgehen ermöglicht die Durchführung kooperativer Studien (z. B. Auswertungen zur Impfeffektivität mit Daten aus Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt).

■ Situation in Deutschland – Angaben des RKI

Das ARE-Geschehen wird weiterhin durch die Zirkulation von Influenzaviren bestimmt. Die Grippewelle hält weiter an, der Höhepunkt der Grippewelle scheint jedoch überschritten zu sein. Influenzaerkrankungen betreffen weiterhin alle Altersgruppen. Die Zahl der Arztbesuche sowie die Zahl der Hospitalisierungen aufgrund akuter Atemwegserkrankungen blieben in den letzten Wochen unter den Werten der Vorsaison um diese Zeit. Seit Beginn der Grippewelle in der 48. KW 2025 werden überwiegend Influenza A(H3N2)-Viren nachgewiesen, seltener Influenza A(H1N1)pdm09-Viren. Die RSV-Aktivität nimmt in den meisten Systemen weiter zu.

Die ARE-Aktivität in der Bevölkerung (GrippeWeb) ist in der 7. KW 2026 im Vergleich zur Vorwoche leicht gesunken und lag auf einem für die Jahreszeit üblichen hohen Niveau. Im ambulanten Bereich (AGI) ist die Zahl der Arztbesuche wegen ARE in der 7. KW 2026 im Vergleich zur Vorwoche leicht gesunken und befand sich nun wieder auf einem moderaten Niveau.

Im Nationalen Referenzzentrum für Influenzaviren wurden in der 7. KW 2026 in insgesamt 92 der 128 eingesandten Sentinelproben respiratorische Viren identifiziert. Es zirkulierten vorwiegend Influenza A-Viren (38 %), mit deutlichem Abstand gefolgt von humanen saisonalen Coronaviren (hCoV; 13 %) und Respiratorischen Synzytialviren (RSV; 12 %). SARS-CoV-2 wurde in 1 % der Proben nachgewiesen. Von den 49 nachgewiesenen Influenzaviren waren 39 A(H3N2)- und zehn A(H1N1)pdm09-Viren.

AGI (Arbeitsgemeinschaft Influenza): <https://influenza.rki.de/>, GrippeWeb: <https://grippeweb.rki.de/>

■ Situation in Europa – Angaben des ECDC und der WHO

In 19 von 31 Ländern oder Gebieten der Europäischen Region der WHO liegt die Rate grippeähnlicher Erkrankungen (ILI) und/oder akuter Atemwegsinfektionen (ARE) in der 07. KW über dem Basiswert. Die regionalen Grippeindikatoren in der Primär- und Sekundärversorgung sinken weiterhin von den erhöhten Werten zu Beginn der Saison. In fast allen Ländern ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Influenza A(H3N2) ist nach wie vor das vorherrschende zirkulierende Virus in der Region, und Erwachsene ab 65 Jahren stellen den größten Anteil der schweren Grippeverläufe dar. Die regionalen Indikatoren für die SARS-CoV-2-Aktivität blieben auf dem Ausgangsniveau. Die regionalen RSV-Indikatoren stabilisieren sich in der Primärversorgung auf einem erhöhten Niveau, steigen aber in der Sekundärversorgung weiter an. Die Phasen der saisonalen RSV-Epidemien variieren erheblich zwischen den Ländern. Die Krankheitslast und die Positivrate sind bei Kindern unter 5 Jahren weiterhin am höchsten.

Der Prozentsatz aller Sentinelproben von Patienten mit ARE oder ILI in der Primärversorgung, die positiv auf ein Influenzavirus getestet wurden, lag mit 23 % weiterhin über der (von der WHO) auf 10 % festgelegten Epidemieschwelle (Vorwoche 26 %). Bei den in der vergangenen Woche von Sentinel-Einrichtungen der Primärversorgung gemeldeten Influenza-Virus-Nachweisen mit bekanntem Typ (n=706) handelte es sich überwiegend um Influenza-A-Viren (99 %). Unter den subtypisierten A-Viren (n=524) gab es eine Mischung aus A(H3N2) (67 %) und A(H1N1)pdm09 (33 %). Die Nachweisrate bei SARS-CoV-2-Testungen lag stabil bei 2 %. Die Nachweisrate bei RSV-Testungen lag bei 9 % (Vorwoche 11 %).

European Respiratory Virus Surveillance Summary: <https://erviss.org/> (WHO/EURO)

■ Aktuelle Bewertung des saisonalen Infektionsgeschehens

Der ARE-Krankenstand in den niedersächsischen Kitas ist in der 8. KW im Vergleich zur Vorwoche leicht angestiegen, blieb aber auf einem ähnlichen Niveau wie seit der 5. KW. In Niedersachsen lag insgesamt die vierte Woche in Folge eine hohe ARE-Aktivität vor.

Die Influenzanachweise waren im Vergleich zur Vorwoche deutlich rückläufig, die RSV-Nachweise dagegen stabil.