



Aquí puede recibir informaciones más detalladas:



- Servicio sanitario (Gesundheitsamt) de su comarca o distrito
- Fachbereich Gesundheit der Region Hannover Tuberkulose-Beratungsstelle
www.hannover.de (> Leben in der Region Hannover > Gesundheit > Gesundheitsschutz > Tuberkulose)
Asesoramiento telefónico: 0511-616-22888
- Medizinische Hochschule Hannover Klinik für Pädiatrische Pneumologie, Allergologie und Neonatologie
www.mhh.de (> Kliniken > Zentrum Kinderheilkunde und Jugendmedizin > Klinik für Pädiatrische Pneumologie, Allergologie und Neonatologie)
Asesoramiento telefónico: 0511-532-3251 o -3220
- Deutsches Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose (DZK)
www.dzk-tuberkulose.de

Edita:

Niedersächsisches Landesgesundheitsamt
Roesebeckstr. 4-6
30449 Hannover
www.nlga.niedersachsen.de
Julio de 2013

En colaboración con:

Fachbereich Gesundheit der Region Hannover
Tuberkulose-Beratungsstelle
Medizinische Hochschule Hannover
Klinik für Pädiatrische Pneumologie, Allergologie und Neonatologie

Derechos de la imagen: © NLGA (Portada, P. 5), Anja Greiner Adam - Fotolia.com (P. 2 y 5); Peter Polak - Fotolia.com (P. 5)



Tuberculosis en los niños

Informaciones para padres y
tutores legales

El riesgo de enfermarse de tuberculosis es mayor en niños que en adultos. Cuanto más pequeños son los niños, tanto mayor es la probabilidad de enfermarse.



Niedersachsen

¿Qué es la tuberculosis?

La tuberculosis es una enfermedad contagiosa originada por bacterias (micobacterias).

Se trata de una enfermedad muy grave que puede conducir a la muerte si no es tratada.

El órgano que con mayor frecuencia enferma de tuberculosis es el pulmón, pero también pueden ser afectados otros órganos. En los niños pequeños existe además un alto riesgo de enfermarse adicionalmente de meningitis tuberculosa (meningitis cerebral).

Los signos típicos de la enfermedad pueden ser una ayuda para reconocer al principio la afección. Los siguientes padecimientos sirven de indicación:

- tos
- fiebre
- cansancio y agotamiento
- pérdida de peso
- sudores nocturnos

Si en una persona se detecta una tuberculosis, la Ley de protección contra las enfermedades contagiosas prescribe una notificación al Servicio Sanitario (Gesundheitsamt). El Servicio Sanitario investiga después, según criterios predeterminados, todas las personas que habían tenido un contacto estrecho con el enfermo. De esta manera se debe impedir que la enfermedad se propague.

Los niños pequeños enfermos no son por lo general contagiosos para otras personas, ya que su tos no es tan fuerte como la de los adultos.

¿Cómo se contagia uno y cómo se reconoce la infección?

Las bacterias se pueden dispersar en el aire por la tos, los estornudos o el habla de una persona enferma de tuberculosis, y pueden ser aspiradas (la llamada infección por gotitas) por otras personas que se encuentran en las proximidades inmediatas.

Una infección con bacterias de tuberculosis sólo puede ser determinada de forma fiable una vez transcurridas 6 o 8 semanas después del contacto con la persona afectada. Para ello se realiza una prueba cutánea o un análisis de sangre.

Debido a que las bacterias de la tuberculosis se reproducen muy lentamente, una enfermedad con trastornos se manifiesta la mayoría de las veces sólo después de meses o, incluso, años. También es posible que, a pesar de haber habido una infección real, la enfermedad no llegue a declararse.

El diagnóstico de tuberculosis queda asegurado mediante radiografías del pulmón y mediante la detección de bacterias de tuberculosis en la secreción de los bronquios. En el caso de niños pequeños también se investiga el jugo gástrico.



Mi niño ha tenido contacto con una persona enferma de tuberculosis: ¿Qué tengo que hacer?

Asesoramiento por el Servicio Sanitario

Todas las personas enfermas de tuberculosis son notificadas al Servicio Sanitario. Este se pone pronto en contacto con usted. En relación con otras cuestiones relacionadas con ello, puede dirigirse a su pediatra.

Prevención de una enfermedad

Los niños menores de 5 años deben ser examinados por un médico inmediatamente después del contacto con una persona enferma de tuberculosis y recibir protección con ayuda de medicamentos. En estos niños es preciso un reconocimiento posterior, una vez transcurridas unas 8 o 12 semanas.

En el caso de niños mayores se ha de sopesar un tratamiento inmediato, según cuál sea el riesgo de caer enfermo. Aquí se comprueba, aproximadamente de 6 a 8 semanas después del último contacto con la persona enferma, si ha tenido lugar una infección.

Tratamiento a cargo de un médico especialista

Después del asesoramiento por el Servicio Sanitario, su niño es tratado, por regla general, por un médico pediatra o en una clínica pediátrica.

La medida más eficaz para la prevención de una enfermedad de tuberculosis es el tratamiento farmacológico preventivo.